



Provtagning för urinodling - mittstråleurin

Patientinformation från laboratoriemedicin på ukrainska

Інструкція для пацієнту

Пробірку для збору сечі можна отримати у лабораторії при поліклініці або у відділенні лікарні. Припиніть вживання вітамінів або препаратів, що містять вітамін С (аскорбінову кислоту), за добу до аналізу. Для достовірності аналізу проміжок між сечовипусканнями має бути не менше 4 годин. Бажано використовувати середню порцію ранкової сечі.

Інструкція

Жінки: Розсуньте статеві губи

Чоловіки: Відсуньте крайню плоть

1. Починайте сечовипускання. Першу порцію сечі, не збираючи, злийте в унітаз. З першою порцією сечі змиваються зайві забруднення продукти секреції сечостатевої системи.
2. Зберіть середню порцію сечі в одноразовий стерильний стакан.
3. Уберіть стакан та продовжіть сечовипускання в унітаз, щоб остання порція сечі не потрапила до пробірки.
4. Перелийте 3-5 мл сечі у стерильну пробірку, видану вам у лабораторії. Наклейте етикетку із вашими персональними даними на пробірку. Зберігати та перевозити аналіз потрібно у прохолодному місці, бажано у целофановому пакеті з льодом.
Важливо: залиште аналіз у лабораторії/відділенні якнайшвидше, обов'язково того ж дня.



Revisionsdatum